



SANI-T-10

Registro Sanitario ISP N° D-493/18

Desinfectante, Sanitizante y Alguicida Líquido 10% a base de Amonios Cuaternarios Quinta Generación

SANIT-10 es un excelente desinfectante y sanitizante de diferentes áreas como: Hospitales (áreas no críticas), restaurantes, industrias de alimentos, colegios, spa, bares e instituciones. Como alguicida, es ideal para uso en tratamientos de piscinas.

Brindando mantenimiento de calidad y soluciones químicas especializadas con un servicio al cliente único desde 1956.





Spartan de Chile Ltda.
Cerro Santa Lucia 9873
Quilicura, Santiago.
(+56)232235782
www.spartan.cl

SANI T10 posee una excelente actividad contra: las bacterias patógenas, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis y Pseudomonas aeruginosa.

SANI-T-10 es un desinfectante concentrado en base a amonios cuaternarios de quinta generación (superquat). Actúa en presencia de aguas duras hasta 800 ppm. de dureza CaCO_3 .

SANI-T-10 es un verdadero desodorizante, ya que destruye tanto las bacterias, como el mal olor causado por las mismas.

SANIT-10 es un excelente desinfectante para utensilios, recipientes de almacenamiento, pisos, paredes, áreas de almacenamiento en frío, refrigeradores, carnicerías, cocinas maquinarias, baños, duchas, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

SANIT-10 como desinfectante de superficies diluir en proporción de 1:170 (588 ppm de amonio cuaternario) en agua potable. Aplicar con paño, mopa, pulverizador o por inmersión. Al ser usado con estas instrucciones es efectivo contra las bacterias, patógenas Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Echerichia Coli, Cándida Albicans, Salmonella y Listeria Monocytogenes.

SANIT-10 como fungicida, utilizar en proporción 1:64 en agua potable, aplicar la solución con paño, pulverizador o por inmersión.

SANIT-10 como **sanitizante** de superficies en contacto con alimentos, limpiar y enjuagar previamente. Luego aplicar dilución 1:512 (195 ppm de amonio cuaternario) en agua potable. Aplicar con paño, mopa, pulverizador o por inmersión. No es necesario enjuagar posteriormente en esta aplicación. Según recomendable permitir un contacto mínimo de 2 minutos entre sanitizante y superficie.

SANIT-10 como **sanitizante** en alimentos, tales como frutas y verduras la dilución será de 1: 512 (195 ppm de amonio cuaternario) también, con tiempo de contacto entre 2 a 3 minutos y posterior enjuague con abundante agua.

SANIT-10 como **Algucida**, aplicar inicialmente una dosis de (1,5 a 2) litros por cada 100 m3, de agua a tratar en piscina al inicio de la temporada de verano.

Si la piscina tiene crecimiento de visible de algas, reaplicar la dosis inicial. Después de 24 horas, aplicar el aspirador de inmersión para remover las algas muertas. Si aún permanecen algas visibles o reaparecen, repetir este procedimiento según sea necesario. Una vez que la piscina quede libre de algas utilizar dosis de mantención (0, 5 a 1,0) lt por cada 100 m3.

La dosis de mantención se debe utilizar con una frecuencia de 3 a 5 días entre aplicación. Si la temperatura ambiental es muy alta o la piscina tiene un uso fuera de lo habitual, agregar la dosis de mantención cada 2 a 3 días.

SANIT-10 es compatible con la mayoría de los productos químicos usados en piscinas, pero **nunca debe mezclar** con jabón u otros limpiadores, o pre-mezclar con otros productos químicos de tratamiento de aguas. La acción más enérgica y eficiente de **SANI-T-10**, se obtiene cuando es agregado directamente al agua de la piscina, sin mezclarlo con ningún otro producto. Utilizar elementos de protección personal al preparar y aplicar el producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Aspecto: Líquido transparente, color incoloro, olor Suave.

Ingredientes Activos (Superquat): 10%

Peso Específico a 25°C: 0.96 - 1.0 g/ml

pH (concentrado) a 25°C: 7.0 – 8.0

Solubilidad: En todas proporciones en agua fría o caliente.

Enjuagabilidad: Completa en agua.

Biodegradabilidad: Si

Vida útil: 24 meses (bajo condiciones adecuadas de almacenamiento)



PRECAUCIONES

Mantener el envase en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada. Se recomienda manipular con guantes y gafas de seguridad. Ropa y zapatos adecuados, si va a pulverizar utilizar mascarilla

PRIMEROS AUXILIOS

Ojos En caso de Contacto Ocular, lavar con abundante agua por 15 minutos. Consulte al médico.

Piel En caso de Contacto Dérmico, lave con bastante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

Ingestión En caso de Ingestión no induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico inmediatamente.

Inhalación Llevar al afectado a un lugar ventilado.

Antídoto No tiene. Tratamiento Sintomático.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.